

Las vacunas duelen un poco...pero las enfermedades duelen mucho más.

Llame la clínica si usted contesta sí a cualquier de las siguientes preguntas:

- ¿Tiene su hijo una calentura de 105° o más por el recto?

  (Recuerde que la tempera–tura de la boca o del sobaco suele ser menos que la del recto.

  Llame la clínica si está preocupada por esto o si tiene duda).

- ¿Parece su hijo pálido o débil?
- ¿Ha estado llorando su hijo por más de 3 horas y no para?
- ¿Suena raro su hijo cuando llora (algo que no es normal)?
- ¿Es el cuerpo de su hijo temblándose o crispándose?

Después de las Vacunas...

¿Qué puede hacer si su hijo tiene molestia?

Por supuesto su hijo necesita más cariño y cuidado después de recibir una vacuna. Muchas de las vacunas que protegen a los niños de enfermedades graves puedan causar molestia por un tiempo. Abajo están algunas respuestas a las preguntas que muchos padres tienen acerca de: ser quisquilloso, la calentura, y el dolor que su hijo pueda tener después de ser vacunado. ¡Si usted no encuentra las respuestas que quiere, llame la clínica!

El número de teléfono de la clínica es: _____

Mi hijo ha sido quisquilloso desde que recibió sus vacunas. ¿Qué debo hacer?

Después de recibir vacunas, los niños pueden ser quisquillosos a causa del dolor y/o la calentura. Usted puede dar a su hijo acetaminophen, una medicina que ayuda reducir la calentura y el dolor. Algunas marcas de acetaminofeno son: Tylenol, Panadol, y Tempra. NO LE DE ASPIRINA. Vea el cuadro abajo. Si es quisquilloso por más de 24 horas, llame la clínica.

El brazo (o la pierna) de mi hijo está inflamado, caliente, y rojo. ¿Qué debo hacer?

- Puede poner una toalla mojada fresca sobre la parte molestada.
- Si aumenta la parte irritada o el dolor a las 24 horas, llame la clínica.
- Por el dolor, dé acetaminofeno. Vea el cuadro abajo. NO LE DE ASPIRINA.

Me parece que mi hijo tiene calentura. ¿Qué debo hacer?

Debe chequear la temperatura de su hijo para saber si tiene calentura. La manera más segura es por el recto (use vaselina). Si la calentura lee 105° o más por el recto, llame la clínica.

Estos son algunas cosas que puede hacer para reducir la calentura.

- Déle a su hijo mucho de tomar (agua, jugo).
- Vístalo de poca ropa. No le ponga colcha ni ropa gruesa.
- Déle acetaminofeno. NO LE DE ASPIRINA.
- Usando esponja bañe a su hijo en unos cuantos centímetros de agua tibia (¡NO FRIA!)

Mi hijo parece muy enfermo. ¿Debo llamar al doctor?

Si usted está preocupada de cómo parece o se siente su hijo, llame la clínica.

¿Cuánta medicina (acetaminofeno) debo darle a mi hijo para reducir la calentura?

Dosis de acetaminofeno para administrarse 4–6 horas, de acuerdo a la edad y al peso del niño

1–3 meses 6–11 libras	4–11 meses 12–17 libras	12–23 meses 18–23 libras	2–3 años 24–35 libras	4–5 años 36–47 libras
½ cuentagotas de gotas para infantes*	1 cuentagotas de gotas para infantes* o ½ cucharadita de jarabe para niños*	1½ cuentagotas de gotas para infantes* o ¾ cucharadita de jarabe para niños*	2 pastillas masticables (80mg)* o 1 cucharadita de jarabe para niños*	3 pastillas masticables (80mg)* o 1½ cucharadita de jarabe para niños*

* Consulte con su farmacéutico para asegurarse que escoge la dosis y formulación indicada para su niño.

Immunization Action Coalition
1573 Selby Avenue, St. Paul, MN 55104
(651) 647-9009
www.immunize.org

Item#P4015-01 (8/99)